

❗ **ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี
ทุกคน
ควรจะได้รับ
การตรวจหา
การติดเชื้อ
ไวรัสตับ
อักเสบบีและซี
เพื่อจะได้
วางแผน
การดูแล
และรักษา
ตนเอง**

**เชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีและซี
อาจเป็น
สาเหตุของ**

📍 หากไม่ได้รับการรักษา
โดยเฉพาะในผู้ที่ติดเชื้อ
เอชไอวี จะมีความเสี่ยง
สูงกว่าผู้ที่ไม่ติดเชื้อ

📍 **สิทธิประโยชน์**
ในทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพ ครอบคลุมการ
ตรวจและรักษา
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย



**ไวรัส
ตับอักเสบบี-ซี
รู้เร็ว รักษาได้**

เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
www.thaiplus.net

B สำหรับ
ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี
และติดเชื้อ
ไวรัสตับ
อักเสบบี

**B- เพื่อจะได้รับ
ยาต้านไวรัสเอชไอวี**
ที่รักษาทั้งเอชไอวีและไวรัส
ตับอักเสบบี สำหรับผู้
ติดเชื้อเอชไอวี และติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งก็คือ
ยาต้านไวรัสฯ สูตรยา
3 ตัวที่มียา 3TC และ
TDF รวมอยู่

C- เพื่อได้รับการตรวจและดูแลรักษา

ตรวจประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับ
การรักษาหรือไม่ เช่น ตรวจสายพันธุ์ จำนวน
ไวรัสตับอักเสบบีในเลือด ตรวจสภาพตับ ฯลฯ

เตรียมความพร้อมสุขภาพก่อนการรักษา
เช่น การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี
ต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 6 เดือน

รักษาโดยใช้ยาอินเตอร์เฟียร์รอน (PEG-IFN)
ฉีดใต้ผิวหนังสัปดาห์ละครั้ง และกินยาโรบาไวริน
24-48 สัปดาห์

**ทำไม
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ต้องรู้ เรื่องไวรัส
ตับอักเสบบี**

สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี-ซี
รู้แบบนี้แล้ว
รีบปรึกษาหมอ
เพื่อขอรับคำปรึกษาและ
ตรวจวินิจฉัยทันที

**ไวรัส
ตับอักเสบบี-ซี
รู้เร็ว รักษาได้**

จะรู้ได้อย่างไร ว่าติดเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบบี และ ซี

HBsAg

เป็นการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

Anti HCV

เป็นการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีเบื้องต้น

Anti HCV

ให้ผลบวก* ต้องตรวจยืนยันการติดเชื้อด้วยการตรวจ

PCR

จะรู้ติดเชื้อหรือไม่
ต้องตรวจเลือด

เพื่อหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ ซี

ปกติผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี จะได้รับการตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของตับ (SGPT หรือ ALT) ทุก 6 เดือน แต่การตรวจนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือ ซี อาจมีค่าการทำงานของตับปกติ หรือ ไม่มีอาการให้เห็น

การติดต่อ

และ

การป้องกัน

ไวรัสตับอักเสบบีและซี มีช่องทางการติดต่อคล้ายกับเชื้อเอชไอวี

❗ ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน

❗ การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน

❗ ทารกที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อ

❗ ไม่ติดต่อจากการใช้ชีวิตประจำวันร่วมกัน

⚙️ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

⚙️ ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

⚙️ เฉพาะไวรัสตับอักเสบบี เด็กแรกเกิดทุกคนจะได้รับวัคซีนป้องกัน

⚙️ มีวัคซีนป้องกันสำหรับผู้ใหญ่ที่ตรวจเลือดแล้วไม่พบการติดเชื้อและไม่มีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (เสียค่าใช้จ่ายเอง)

Hepatitis
B·C