

“เชื่อเมื่น U=U
คุณกับเราเท่ากัน”

Undetectable

Untransmittable

สอบถาม/ปรึกษา :

ทีมรักษา หรือทีมศูนย์องค์รวม
เพื่อให้ U=U อยู่กับเราไปตลอด

จัดทำโดย : เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย
494 ลาดพร้าว 101 (รอย 14)
ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

✉ thaiplust@gmail.com
🌐 www.thaiplus.net
 FACEBOOK: www.facebook.com/TNPplus
พัฒนาโดย บริษัท ชาเรนการพิมพ์ จำกัด



U=U
ยูเท่ากับยู



U = U
(ยูเท่ากับยู)
คืออะไร

ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์
บอกกับเราว่า...

U=U (ยูเท่ากับยู):

Undetectable = Untransmittable
คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่กินยาต้านไวรัสฯ
จนตรวจไม่พบเชื้อในเลือด
'เท่ากัน' ไม่ส่งต่อเชื้อให้คนอื่น

“
มี หรือไม่มีเชื้อไวรัส
ทุกคนใช้ชีวิต
ได้เหมือนกัน”

99



กำความรู้จักไวรัลโลด

ไวรัลโลด (Viral Load: VL) หรือจำนวนไวรัสในเลือด เพื่อดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

จำนวนไวรัลโลด	การส่งต่อเชื้อเอชไอวี
VL < 50	<ul style="list-style-type: none"> ไม่ส่งต่อเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ไม่ส่งต่อเชื้อให้ทางแรกระเกิด (แต่ต้องมี VL<50 ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงคลอด และหลังคลอดในกรณีให้นมบุตร)
VL < 200	ไม่ส่งต่อเชื้อทางเพศสัมพันธ์
VL < 1,000	ผลการรักษาดี ยาต้านไวรัลฯ กดเชื้อได้ ไม่ต้องยาสูตรที่กำลังกิน

การใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับผู้ติดเชื้อฯ ไม่ว่าจะ VL เท่าไรก็ไม่ทำให้ติดเชื้อเอชไอวี

สิกธิประโยชน์ การตรวจแล็บอื่น ที่ผู้ติดเชื้อฯ ต้องได้รับ

ชุดสิกธิประโยชน์	รายละเอียด
ตรวจซีดี 4	<ul style="list-style-type: none"> รับการตรวจทุก 6 - 12 เดือน ถ้ากินยาต้านไวรัลฯ และซีดี 4 > 350 และ VL< 50 ติดต่อกัน 2 ปี ไม่ต้องตรวจซีดี 4
ตรวจ ติดตาม การรักษา ด้วยยา ต้านไวรัลฯ	<ul style="list-style-type: none"> ทุก 6 - 12 เดือน ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) น้ำตาลในเลือด (FBS) การทำงานของตับ (SGPT/ALT) ไขมันในเลือด (Chol TG) การทำงานของไต ครีเอตินิน (Cr) ตรวจปัสสาวะ (UA) ดูอัตราการกรองของไต (eGFR)

Undetectable



Untransmittable

เมื่อไรควรได้ตรวจไวรัลโลด

- กินยาต้านไวรัลฯ เกิน 6 เดือน ตรวจ VL ปีละ 1 ครั้ง
- หาก VL >1,000 ส่งตรวจหาเชื้อด้วยยา

ทำอย่างไรให้ U=U ไปตลอด

- ผู้ติดเชื้อฯ ที่กินยาต้านไวรัลฯ มานาน แม้จะตรวจไม่พบเชื้อในเลือด แต่ต้องกินยาต้านไวรัลฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกดเชื้อให้ U=U ไปตลอด
- ผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่ หากได้รับยาต้านไวรัลฯ ภายในวันเดียวกับวันที่ตรวจเลือด และทราบผลการติดเชื้อเอชไอวี หรือ Same day ART จะช่วยให้ U=U เกิดได้เร็วขึ้น



“ได้ตรวจแล็บตามมาตรฐาน รับรู้และเข้าใจผลตรวจของตนเอง จะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อฯ”

