

“ การตรวจคัดกรองและวินิจฉัย ตามแนวทางการรักษาเอชไอวี/เอดส์ ”

ตรวจคัดกรองการติดเชื้อ และโรคต่าง ๆ

- 1 วัณโรค
- 2 ไวรัสตับอักเสบบี
และไวรัสตับอักเสบบีซี
- 3 โรคซิฟิลิสและโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์อื่น
- 4 มะเร็งปากมดลูก
- 5 มะเร็งทวารหนัก
(เฉพาะคนที่มี Anal Sex)
- 6 คัดกรอง วินิจฉัย
โรคฉวยโอกาส

ตรวจติดตามผลการรักษาด้วยยาต้านฯ

การตรวจ	ช่วงเวลา
<ul style="list-style-type: none"> ● ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ● น้ำตาลในเลือด (FBS) ● การทำงานของตับ (SGPT/ALT) ● ครีเอตินิน (Cr) อัตราการกรองของไต (eGFR) ตรวจปัสสาวะ (UA) ● ไขมันในเลือด (Chol LDL TG) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือ 12 เดือน ✓ ตรวจสอบเมื่อมีข้อบ่งชี้
<ul style="list-style-type: none"> ● ไวรัลโหลด (VL) - จำนวนไวรัสเอชไอวีในเลือด 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ กินยาต้านฯ เกิน 6 เดือน ตรวจปีละ 1 ครั้ง ✓ ตรวจสอบเมื่อมีข้อบ่งชี้
<ul style="list-style-type: none"> ● ซีดี 4 (CD4) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ซีดี 4 น้อยกว่า 350 และ VL มากกว่า 200 ตรวจซีดี 4 ทุก 6 เดือน ✗ ซีดี 4 มากกว่า 350 และ VL น้อยกว่า 50 ต่อเนื่อง 2 ปี ไม่ต้องตรวจซีดี 4
<ul style="list-style-type: none"> ● ตรวจหาเชื้อเอชไอวีดี้อย่า 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ไวรัลโหลด เกิน 1,000

เมษายน 2569

