

ยาต้านไวรัสเอชไอวี

กลุ่มเอ็นอาร์ทีไอ NRTI

ทีดีเอฟ (TDF)



- ไตทำงานผิดปกติ
- มวลกระดูกบาง

3ทีซี (3TC)



- ผลข้างเคียงน้อย
- ผมร่วง ปวดกล้ามเนื้อ (พบได้น้อย)

อะบาคาเวียร์ (ABC)



- มีไข้ มีผื่น หายใจลำบาก
- คนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรหลีกเลี่ยง

ทาฟ (TAF)



- มีผลต่อมวลกระดูกและไตน้อยกว่าทีดีเอฟ
- ไชมันในเลือดเพิ่มขึ้น
- น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น

เอฟทีซี (FTC)

- ผลข้างเคียงน้อย
- ผมร่วง ปวดกล้ามเนื้อ (พบได้น้อย)

เอแซดที (AZT)



- ซีด โลหิตจาง
- เล็บคล้ำดำ
- ไชมันย้ายที่ เช่น แก้มตอบ แขนขาเล็บ มีพุง หนอง

กลุ่มเอ็นเอ็นอาร์ทีไอ (NNRTI)

เอฟฟาไวเรนซ์ (EFV)



- หลอน งง ผื่นแปลก
- ไชมันในเลือดสูง
- เต้านมโต

เนวีราพีน (NVP)



- มีผื่นแพ้
- เป็นพิษต่อตับ

ริลพิไวเรนซ์ (RPV)



- ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาเอฟฟาไวเรนซ์
- ต้องกินพร้อมอาหาร

กลุ่มพีไอ (PI)

ดาร์นาเวียร์ (DRV)



- ท้องเสีย
- ไชมันย้ายที่
- เบาหวาน ไชมันในเลือดสูง

อะทส์นาเวียร์ (ATV)



- ตัว ตาเหลือง
- ไชมันย้ายที่
- เบาหวาน ไชมันในเลือดสูง

ริโทนาเวียร์



- ใช้เสริมฤทธิ์ยาดาร์นาเวียร์หรือยาอะทส์นาเวียร์

กลุ่มไอเอ็นเอสทีไอ (INSTI)

โดลูเทกราเวียร์ (DTG)



- ค่าของเสียในเลือด (Cr.) เพิ่มขึ้น
- นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ
- ซึมเศร้า (พบได้น้อย)
- ตับอักเสบ ผื่นแพ้
- น้ำหนักตัวเพิ่ม

บิคเทกราเวียร์ (Bictegravir)

ไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์

ยาต้านฯ ที่ออกฤทธิ์นาน (Long-acting ARV)

เลนาคาปาเวียร์ (Lenacapavir)

คาโบเทกราเวียร์ (Cabotegravir)

มีทั้งชนิดกินและชนิดฉีด ไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์

ยาต้านฯ แบบรวมเม็ด

ยารวมเม็ด 3 ชนิด

TDF/3TC/DTG



TAF/FTC/DTG



TDF/FTC/EFV



ยารวมเม็ด 2 ชนิด

TDF/FTC



TAF/FTC



ABC/3TC



3TC/DTG



มีแผนผลิตปี 2570

